



THE
WORLD
BANK



Dự án VnSAT - Chuyển đổi nông nghiệp bền vững

BẢN TIN TUẦN

Tuần 01 (từ 02/01 - 07/01/2017)




ĐIỂM NHẤN THỊ TRƯỜNG

Giá cà phê Thế giới trên sàn London và New York tăng nhẹ

Giá cà phê tại Việt Nam vẫn trong xu hướng tích cực

Sản xuất cà phê Robusta tại Việt Nam niên vụ 2017 - 2018 được dự đoán tăng

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI



Nguồn: AGROINFO tổng hợp


Các thị trường cà phê tương lai đã tăng mạnh trong hầu hết năm 2016, được thúc đẩy bởi những lo ngại về nguồn cung, đặc biệt là trên thị trường cà phê Robusta, khiến ngay cả giá cà phê Arabica chất lượng thấp cũng được kéo tăng.

Giá cà phê Arabica tương lai quay đầu giảm vào cuối năm, do giai đoạn ra hoa gần đây của Brazil làm dấy lên hy vọng về khả năng



tăng sản lượng trong năm 2017, mặc dù theo chu kỳ nông học, năm 2017 là năm sản lượng thấp.

Commerzbank cho rằng giá cà phê sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, thị trường có thể sẽ bị gián đoạn đà tăng do biến động tỷ giá. Nếu đồng Real Brazil tiếp tục giảm giá như dự đoán – đặc biệt là khi Mỹ tăng lãi suất – giá cà phê sẽ chịu áp lực giảm.



Nguồn: AGROINFO tổng hợp

Hôm nay (06/01), giá cà phê tại thị trường Việt Nam và thế giới nhẹ. Giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn 01/17 giảm 12 USD/tấn hay -1% lên mức 2.195 USD/tấn, các kỳ hạn khác cũng giảm 11-13USD/tấn. Giá cà phê arabica trên sàn New York kỳ hạn 03/17 tăng mạnh 1,95 cent/lb hay +1,38% lên mức 145,45 cent/lb, các kỳ hạn khác cũng tăng 1,90 – 1,95 cent/lb.

Trong tuần giá cà phê Robusta BQ trên sàn London đạt 2.145,3 USD/tấn, tăng 1,97% so với tuần trước và cao hơn 45% so với cùng kỳ năm 2015, giá cao nhất trong tuần đạt 2.165 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.124 USD/tấn. Trong khi đó giá cà phê Arabica trên sàn kỳ hạn New York bình quân trong tuần đạt 3.086,5 USD/tấn tăng 3,63% so với tuần trước và cao hơn 12,4% so với cùng thời điểm năm 2016.

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Tồn kho Arabica trên sàn kỳ hạn New York đã giảm 2.487 bao vào ngày 06/01/2017 đưa mức tồn kho về mức 1.252.202 triệu bao.

Thâm hụt cà phê toàn cầu niên vụ 2014/15 và 2015/16 lần lượt đạt 2,7 triệu bao và 3,3 triệu bao đã làm giảm mạnh các kho dự trữ tích lũy trước đây. Niên vụ 2016/17 được dự đoán tiếp tục là năm toàn cầu thâm hụt cà phê.

Sau 3 năm thâm hụt cà phê liên tiếp trên thị trường toàn cầu vào 2014-15, 2015-16 và 2016-17, Rabobank cho rằng thế giới tiếp tục thâm hụt 2 triệu bao cà phê trong niên vụ 2017-18.

Thâm hụt 4 năm liên tiếp trên thị trường cà phê tích lũy kể lên tới gần 10 triệu bao, sẽ làm giảm phần lớn lượng dự trữ 12,6 triệu bao trên toàn cầu, tích lũy từ 2 niên vụ bội thu là 2012-13 và 2013-14.




Rabobank dự báo sản xuất cà phê Arabica niên vụ 2016/17 sẽ tăng. Xét tới sản xuất tại Peru phục hồi mạnh lên 4,7 triệu tấn trong niên vụ 2016/17, và sản lượng tăng nhẹ tại Colombia, Honduras, Mexico và Nicaragua, mức tăng sản lượng cà phê Arabica, không tính Brazil, sẽ là 1,7 triệu bao.

Rabobank cho rằng tỷ trọng sản lượng cà phê Robusta tại các nước không sản xuất cà phê sẽ dần suy giảm từ mức 35,6% trong niên vụ 2015-16 xuống 35,1% trong 2016-17 và 34% trong 2017-18. Trong bối cảnh này, chênh lệch giá cà phê Arabica và Robusta sẽ giảm, đặc biệt là do thâm hụt mạnh cà phê Robusta toàn cầu, nhưng nguồn cung cà phê Arabica lại dồi dào.


THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Sáng nay (30/12), giá cà phê nhân xô tại Tây Nguyên giảm 200 ngàn đồng/tấn, đạt mức 44,8 - 45,3 triệu đồng/ tấn.

Kết thúc tuần giá cà phê tại thị trường Đắk Lắk tăng 2,37% so với tuần trước và cao hơn 34,7% so với cùng kỳ năm 2016. Giá cao nhất trong tuần đạt 45.500 VNĐ/kg, giá thấp nhất trong tuần 44.700 VNĐ/kg.



Nguồn: AGROINFO tổng hợp





TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

Sản xuất cà phê Robusta tại Việt Nam niên vụ 2017/18 được dự đoán tăng, cũng sẽ gây áp lực giảm giá.

Giá cà phê đã liên tục tăng kể từ đầu năm 2016 và phá vỡ mức giá trần 160 cents/pound. Thời tiết bất lợi tại Brazil và Việt Nam làm giảm năng suất và đẩy giá tăng.

TIN DỊCH BỆNH

Diễn biến dịch bệnh trên cây cà phê tại một số địa phương trong tuần qua như sau:

ĐẮK LẮK:

Tình hình dịch bệnh trong tuần:

Rệp sáp TLH: 2-6%; Rệp sáp mềm xanh TLH: 5-9%; Nấm hồng TLH: 3-5%; Rỉ sắt TLB: 5-20%, DTN 5,9ha (M'Đrăk, Ea Hleo); Đốm mắt cua TLH: 5-10%; Tuyến trùng TLH: 3-8%; Mọt đục quả TLH: 5-10%; Khô cành, khô quả TLH: 3-5% gây hại rải rác.

Dự kiến thời gian tới:

Chỉ đạo thu hoạch cà phê chín đến đâu thu hái đến đó không thu hái cà phê xanh để đảm bảo năng suất, chất lượng cà phê. Hướng dẫn nông dân hái đến đâu tiến hành vệ sinh vườn cây, cắt chồi, tỉa cành, tạo tán, rong tỉa cây che bóng, loại trừ các cành khô chết, cành sâu, bệnh nặng đem tiêu hủy...

ĐẮK NÔNG:

Tình hình dịch bệnh trong tuần:

Các đối tượng gây hại như: Bệnh khô cành DTN 0,7 ha, TLB 8,3 – 16,7%, gây hại tại thị trấn Eating, xã Trúc Sơn, huyện Cư Júit. Ngoài ra bệnh rỉ sắt, đốm mắt cua, mọt đục cành, sâu đục thân,... gây hại rải rác, TLH thấp.

Dự kiến thời gian tới:

Cần đề phòng các đối tượng như: Bệnh gỉ sắt, đốm mắt cua, sâu đục thân, cành,...

GIA LAI:

Tình hình dịch bệnh trong tuần:

Bệnh Gỉ sắt 5-57% DTN 7059 ha, Bệnh khô cành TLB 5-50%, DTN 6.598ha; rệp sáp TLH 5-50%, DTN 1.763ha gây hại giảm nhẹ; mọt đục cành, thán thư lá, ve sầu gây hại cục bộ.

Dự kiến thời gian tới:

Bệnh gỉ sắt, khô cành tiếp tục gây hại; mọt đục cành, sâu đục thân gây hại rải rác.

**LÂM ĐỒNG:****Tình hình dịch bệnh trong tuần:**

Sâu đục thân: Gây hại 1.192ha cà phê chè tại Đà Lạt, giảm 18,7ha (180ha nhiễm nặng), TLH 11 – 30%; Bọ xít muỗi: Ít biến động so với kỳ trước, trong tuần bọ xít muỗi gây hại 1.175,5ha cà phê chè (167,1ha bị hại nặng), TLH 13,5 – 40%; Các đối tượng dịch hại khác như rệp sáp, rỉ sắt, thán thư, mọt đục quả...gây hại nhẹ.

Dự kiến thời gian tới:

Sâu đục thân: Sau khi thu hoạch áp dụng triệt để biện pháp cắt tỉa thân, cành, đào bỏ và tiêu hủy gốc cà phê đã bị sâu đục thân gây hại nặng. Có thể sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ *Chlorpyrifos Ethyl + Alpha-Cypermethrin* (Supertac 500EC), *Diazinon* (Diazan 50EC, Diazol 10GR).

Bọ xít muỗi: Hiện tại cà phê đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, tiến hành cắt tỉa chồi, đọt non đã bị bọ xít muỗi gây hại. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phát hiện kịp thời bọ xít muỗi gây hại, phun thuốc phòng trừ từ 1 - 2 đợt mỗi đợt cách nhau 10 - 15 ngày. Có thể sử dụng thuốc có hoạt chất *Alpha-cypermethrin + Chlorpyrifos Ethyl* (Supertac 500EC), nồng độ 0,18%, lượng nước sử dụng 1.000 lít/ha.

KON TUM:**Tình hình dịch bệnh trong tuần:**

Rệp sáp, mọt đục cành rải rác; bệnh gỉ sắt, bệnh khô cành, bệnh đốm mắt cua gây hại nhẹ tại các vùng, TLB 2 - 4%; bệnh nấm hồng cục bộ tại Kon Plông.

Bệnh lở cổ rễ rải rác tại Đắk Hà.

Dự kiến thời gian tới:

Rệp sáp, mọt đục cành, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm mắt cua, bệnh nấm hồng trên cà phê KD; bệnh lở cổ rễ trên cà phê rải rác.



Nguồn tham khảo:

- <https://scasa.co.za/blogs/market-reports>
- <http://www.ico.org/>
- <http://www.agrimoney.com/>
- <http://www.reuters.com/>
- <http://vinanet.vn/>
- <http://giacaphe.com/>



Bản tin được thực hiện bởi **AGROiNFO**

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Email: info@agro.gov.vn

Website: www.agro.gov.vn